A PLATAFORMA CONTINENTAL DE PERNAMBUCO (BRASIL):

Nota preliminar sôbre a natureza do fundo *

MARC KEMPF

ABSTRACT

The first results of a benthic survey of the continental shelf off Pernambuco State (NE Brazil), conducted between november 1968 and march 1969, are exposed. They are completed wiht former data obtained by the Laboratório de Ciências do Mar (ex-Instituto Oceanográfico), Recife, in the same region and its vicinity. These works are briefly related here and should be consulted for more detail about the bottom types present in the area: reef, quartz sand, mud, calcareous algae with an occasional *Halimeda* facies, and organogenic material. Final remarks about fishery, suggested by the observation of the benthos, conclude the note.

Explanation of the plates.

1. Topographical chart joining the present samples with former surveys conducted in the same area.

2. Bottom characters of the shelf:

(Rec)	Reefs	(S/CA)	Transition
(M)	Mud	(CA)	Calcareous algae
(BM-MS)	Mud present	(CAh)	<i>Halimeda</i>
(B)	Quart sand	(O)	Organogenic material

3. Cross section of the shelf off Recife (symbols as in fig. 2).

* Trabalho realizado com auxílio da SUDENE.

Cópias do manuscrito da presente nota foram apresentadas à SUDENE à título de relatório.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho decorre de uma recente prospecção de pesca realizada pela SUDENE (Divisão de Recursos Pesqueiros) na plataforma continental do Estado de Pernambuco. As generalidades sobre a natureza do fundo e sua cartografia serão expostas, devendo ser publicado, no futuro, um estudo geológico e biológico das amostras coletadas.

Resultados anteriores, obtidos pelo Laboratório de Ciências do Mar (então Instituto Oceanográfico) na mesma área ou em Estados vizinhos, tornam este estudo mais fácil e o completam. As publicações correspondentes, sumariamente analisadas no próximo parágrafo, fornecem um grande número de indicações cuja repetição, aqui, seria fastidiosa. Constam, notadamente, os métodos de trabalho, as definições dos principais tipos de fundo encontrados, generalidades sobre seu povoamento e noções de bionomia bética. A mais larga utilização daqueles resultados será feita no presente trabalho sem que, obrigatoriamente, as citações sejam indicadas cada vez no texto. Pela mesma razão, será dada apenas uma bibliografia sumária, o resto das referências podendo ser encontrado naquelas publicações.

Área estudada. — O levantamento foi efetuado entre novembro 1968 e março 1969 e abrangeu a plataforma continental do Estado de Pernambuco, entre 07°33' e 08°55' lat. S., com coletas dispostas em linhas perpendiculares à costa. As estações estão relacionadas na Tabela 1 (lista das estações) e figuradas no mapa da Fig. 2. O mesmo mapa indica também os estudos realizados anteriormente no setor ou em suas margens, o que, para um melhor entendimento do conjunto, amplia um pouco a área representada (até 07°25' e 09°15' lat. S.).

Método de trabalho. — As viagens foram executadas por um barco da Divisão de Recursos Pesqueiros que realizou conjuntamente operações oceanográficas e de pesca. O material, objeto do presente estudo, foi coletado por meio de dragagens, conservado bruto em formol e separado no laboratório, ocasião em que foram feitas as observações relacionadas aqui.

O livro de bordo do barco forneceu a posição das estações; tratam-se de localizações por ponto astronômico, estimativa ou referência à marcas em terra. Em certos casos, várias dragagens foram efetuadas em redor de um mesmo ponto intermediário que representa então a estação.

Agradecimentos. — Um auxílio material da SUDENE tornou possível a execução do presente trabalho. Agradeço em par-

tecular aos pesquisadores do Setor de Prospecção, da Divisão de Recursos Pesqueiros da mesma Instituição, por sua colaboração, como também aos técnicos do Laboratório de Ciências do Mar, Aristóteles Nascimento dos Santos e Jorge Pinheiro de Freitas, responsáveis pela coleta e separação do material.

TRABALHOS ANTERIORES

Foram considerados apenas os trabalhos estreitamente ligados ao bentos da área estudada. O mapa da Fig. 1 assinala de modo especial os setores muito homogêneos ou com grande densidade de amostras. Estações isoladas figuram no mesmo mapa e constam também da Tabela 1. Não estão representadas, embora tenham sido levadas em conta, sete estações do navio oceanográfico "Calypso" realizadas nas proximidades do Cabo de São Agostinho em novembro 1961, (Forest, 1966). As publicações citadas a seguir convém acrescentar o trabalho de Laborel (1967) onde uma parte importante é dedicada aos recifes da região.

Tamandaré, 1961-1962. — (Rebouças, 1962 e 1967). Estudo geológico da Baía de Tamandaré, limitado para o lado do mar pelos recifes coralíneos. Duzentas amostras foram examinadas, provenientes de área muito reduzida. Foi assinalada a existência de pequena mancha de lama arenosa numa depressão atrás do recife, sendo a maioria dos sedimentos formada de areia biotritica de origem recifal.

Alagoas e Sergipe, 1965. — (Cavalcanti e outros, 1966; idem, 1967; Mabeoone e Tinoco, 1967; Kempf, no prelo b). Levantamento da plataforma continental dos Estados de Alagoas e Sergipe. As estações mais próximas de Pernambuco estão incluídas no presente trabalho ("Akaroa" e "Canopus").

Recife, 1966-1967. — (Kempf, Mabeoone e Tinoco, no prelo). Estudo detalhado do setor de Recife, entre Olinda e o Cabo de São Agostinho, com 160 estações distribuídas sobre a plataforma continental, e apoiado por um levantamento batimétrico recente da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Este trabalho foi utilizado em sua totalidade na presente publicação.

N-NE do Brasil, 1965-1967. — (Kempf, Coutinho e Moraes, 1968; Kempf, no prelo b). O primeiro trabalho é um levantamento extensivo da plataforma continental entre Recife e Cabo Orange. As estações localizadas em Pernambuco ou contíguas a ela estão incluídas no presente trabalho ("Saldanha" e "Canopus"). O segundo constitui uma síntese dos trabalhos precedentes em toda a área N-NE do Brasil, com ênfase nos aspectos bionômicos.

Itamaracá, 1968-1969. — (Kempff, no prelo a). Estudo detalhado de uma zona costeira limitada pelos recifes e situada entre Carne de Vaca e Pau Amarelo. Um total de 115 estações permitiu evidenciar uma dominância de fundos de areia com proporções variadas de quartzo e elementos biotetríticos, em parte ocupados por prados de uma fanerógama marinha. O traçado dos recifes coralíneos foi utilizado no presente trabalho, como também foi transcrita a localização de uma mancha de lama situada na proteção da parte N destes últimos.

RESULTADOS DA PRESENTE PROSPECÇÃO

Topografia

Dados batimétricos muito precisos foram obtidos apenas no setor de Recife, graças ao trabalho da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Os resultados expostos podem, de uma maneira geral, ser aplicados à totalidade da área presentemente estudada. Trata-se, no conjunto, de uma plataforma pouco larga (18-20 milhas, em frente à Recife), relativamente plana e terminada por um declive abrupto ocorrendo entre 60 e 80 m. As isóbatas de 10, 20, 50 e 100 m indicadas no mapa (Fig. 1), como também um perfil realizado em frente à Recife (Fig. 3), ilustram este fato.

Confrontado com sondagens recentes da Diretoria de Hidrografia e Navegação, o mapa náutico n.º 900, utilizado como base cartográfica do trabalho, revela algumas imperfeições no traçado de suas isóbatas, o que pôde ser verificado no setor de Recife. Em particular, a inexistência dos altos fundos assinalados no talude entre Recife e o Cabo de Sto. Agostinho foi comprovada por vários navios hidrográficos da Marinha, o último tendo sido o "Taurus" que varreu sistematicamente esta área até a profundidade de 1.000 m. em abril-maio 1967.

Natureza dos fundos

A densidade das estações realizadas em frente à Recife permitiu a delimitação com relativa precisão dos principais tipos de fundo que ocorrem no referido setor. O presente levantamento evidenciou que este esquema se mostra válido para toda a área considerada aqui e pôde também ser relacionado com os fatos observados mais ao sul, no Estado de Alagoas.

Como exposto nos trabalhos já citados, os critérios adotados para a caracterização dos tipos de fundo constam simultaneamente de observações geológicas e biológicas, como granulome-

tria simplificada do sedimento, teor de CaCO_3 , presença e frequência de quartzo ou de algas calcárias. No presente caso, só foram realizadas observações macroscópicas e um controle do sedimento na lupa binocular a fim de relacionar as amostras com as definições precedentemente estabelecidas. Uma análise mais detalhada do sedimento está em fase de execução no Departamento de Geologia do Laboratório de Ciências do Mar e será divulgada noutra oportunidade.

Recifes. — Linhas de arenito afloram em certas praias ou são contíguas à elas. Existem também recifes de corais e algas calcárias, igualmente contíguas à praia, ou estabelecidas a certa distância, e supostas como tendo um embasamento arenítico submerso. Esta faixa não foi investigada pelo presente estudo. Maiores detalhes sobre os complexos arenito-coralíneos da região encontram-se no trabalho de Laborel (1967). Os recifes mapeados na Fig. 1 foram tirados da carta náutica n.º 900 completada por dados da referida publicação, como também de outras precedentemente citadas (Rebouças, 1967; Kempff, Mabesoone e Tinoco, no prelo; Kempff, no prelo a). Embora os mais importantes sejam coralíneos, não é feita discriminação quanto a sua origem. Também o seu nível batimétrico não é indicado: podem ser submersos ou descobertos total ou parcialmente na maré baixa. No caso de recifes de corais e algas calcárias, estes estão cercados por um sedimento rico em fragmentos biotetríticos e, por consequência, em calcário.

Areia quartzosa. — A maior parte do domínio litorâneo é ocupada por areia adjacente à praia ou começando além dos recifes, quando estes existem. Trata-se de areia média-grosseira, com uma certa porcentagem de material biotetrítico aumentando com a profundidade e o afastamento da costa. Pequenos blocos de algas calcárias podem estar presentes em toda a área, porém sempre em volume menor que o quartzo.

Lama. — Existe lama junto com areia em certos lugares, principalmente no sul da área estudada, ou concentrada em pequenas manchas, geralmente na dependência dos rios costeiros. Ela ocorre também atrás de certos recifes de corais quando há uma depressão onde sua acumulação é possível (Tamandaré, Recife, Carne de Vaca). Trata-se de argila terrígena, com uma certa quantidade de areia fina, quartzosa e biotetrítica, e de matéria orgânica.

Transição. — Este fundo, composto por uma mistura de quartzo e de algas calcárias em proporções aproximadamente iguais, foi indicado apenas no setor de Recife onde a densidade

das estações permitiu seu mapeamento. Uma passagem gradativa entre a areia quartzosa e as algas calcárias existe naturalmente em toda a área estudada.

Algas calcárias. — O fundo de algas calcárias é caracterizado pela dominância quase exclusiva de Rhodophyceae calcificadas do grupo das Melobesiae (Corallinaceae), presentes sob a forma de talos livres, ramificados (como no caso mais frequente do gênero *Lithothamnium*) ou em lamelas, ou de talos incrustantes elaborando blocos maciços. A desagregação deste material produz uma fração arenosa, de proporções variáveis no sedimento, e uma pequena porcentagem de lama calcária, presa entre os talos vivos e os fragmentos mortos. Como é de se esperar, o teor de carbonato deste sedimento é muito elevado, sempre superior a 90%. Uma pequena quantidade de quartzo encontra-se apenas nas partes mais rasas e desaparece com o afastamento da costa.

Artículos de *Halimeda* (Chlorophyceae calcificada) estão sempre presentes no sedimento, podendo dominar em certas áreas, às vezes bastante extensas, onde constituem então uma variante do fundo de algas calcárias. Consequentemente, as Melobesiae e seus resíduos arenosos diminuem muito em importância, enquanto um pequeno aumento da fração fina pode ser notado no sedimento.

Na área estudada, o fundo de algas calcárias tem seu limite superior próximo à isóbata de 20 m. O limite inferior compatível com a vida das Melobesiae parece localizado entre 80 e 90 m. Como fica evidente nas Figs. 2 e 3, as algas calcárias ocupam assim a parte mais importante da plataforma continental. Um certo gradiente nas condições ecológicas, que não está sendo considerado aqui, aparece em relação à profundidade e à distância do litoral. Uma primeira grande subdivisão pode ser estabelecida em função da iluminação na zona de 35 à 40 m. entre os níveis infra e circalitoral, de acordo com observações baseadas no estudo das algas não calcificadas e da única fanerógama (*Halophila*) que vive neste fundo. Por outro lado, o aspecto das Melobesiae também varia, essencialmente em função da profundidade: (1) as formas livres e ramificadas do gênero *Lithothamnium* dominam até 40 m ou seja na maior parte da plataforma (Fig. 3), (2) blocos maciços aliados à proporções variáveis de areia calcária estão presentes principalmente entre 40 e 60 m, (3) enquanto talos livres em forma de lamelas finas e leves aparecem a partir de 70 m até o limite inferior compatível com a vida das algas pluricelulares. Estes últimos estão associados com esponjas, presentes em grande número, e corais

cláfilos, num aglomerado pouco coerente que confere à zona inferior do fundo de algas calcárias um aspecto em grande parte animal, como é de regra cada vez que as condições de iluminação tornam-se insuficientes à vida vegetal.

Organogênico. — Este fundo está situado imediatamente abaixo do precedente, do qual difere em primeiro lugar pela ausência de Melobesiae vivas. Paralelamente, a percentagem de lama do sedimento é maior. O teor de calcário fica sempre elevado. A posição do fundo organogênico na beira da plataforma limita sua extensão topográfica (Fig. 3). Nenhuma coleta do presente levantamento foi realizada em profundidade suficiente: no máximo, a transição com a zona inferior do fundo de algas calcárias foi atingida.

RELAÇÕES COM A PESCA E APLICAÇÕES PRÁTICAS

A parte pesqueira do presente estudo ficou inteiramente a cargo da Divisão de Recursos Pesqueiros da SUDENE. Portanto, os comentários sobre a pesca serão limitados à algumas deduções sugeridas pela observação do bentos.

Algas calcárias. — O fundo de algas calcárias domina a área e constitui também a principal característica de todo o NE brasileiro. Devido à concreções orgânicas, as irregularidades do substrato impedem o emprego de redes de arrasto em condições normais neste trecho da plataforma continental, sendo as zonas mais interessantes situadas em suas margens: faixa litorânea e talude continental. Este fundo é o domínio das lagostas do gênero *Panulirus* que encontram nele seu terreno de predileção. Como o ambiente se estende além das profundidades comumente exploradas, uma pesca experimental da zona dos 40-60 m, ou mais, parece aconselhável.

Por outro lado, as algas calcárias apresentam um recurso potencial até agora inexplorado: sua utilização como fonte de calcário e adubo corretor de solos. Além da riqueza em CaCO_3 , já citada, conveniente para calagem, o sedimento contém teores de K e de P_2O_5 que o recomendam como fertilizante. Pesquisas sobre suas propriedades estão sendo executadas em colaboração com o Laboratório de Ciências do Mar. Fundos semelhantes são aproveitados em vários países, como por exemplo na França, onde, além da exploração artesanal, cinco empresas se dedicam à sua comercialização para fins agrícolas, como adubos e rações para aves (Chalumeau, 1964). Esta riqueza em cálcio, constituindo uma fonte inesgotável de calcário, deve ser lembrada também numa hora em que se pensa explorar em larga escala os recifes coralíneos costeiros. Sem entrar em considerações de

ordem econômica, parece muito mais razoável e positivo apelar para este sedimento tão abundante e fácil de dragar do que destruir sem esperança de reconstituição o ambiente natural e a proteção do litoral que são os recifes.

Domínio litorâneo. — No presente caso, a faixa arenosa e as manchas de lama que ela contém apresentam um certo interesse. Camarões de valor comercial e siris do gênero *Callinectes* estão presentes, como também peixes bentônicos importantes notadamente os representantes da família Scianidae. Parece indicada uma pesquisa especialmente dedicada à esta zona e aconselhável a localização exata de todos os fundos de lama. O arrasto seria possível, porém em escala muito reduzida devido à exiguidade do ambiente e a proximidade da costa.

Por outro lado, dragagens na faixa arenosa de Recife, entre 12 e 18 m, revelaram a existência de um molusco de interesse comercial, o Pelecypoda *Chione pubera* (Val.) Bory de St. Vincent, cuja ocorrência é conhecida das Antilhas ao Sul do Brasil. Coletas com uma draga especial para moluscos provaram que este recurso é razoavelmente comum e mereceria um estudo aprofundado.

Talude continental. — Como mostraram as sondagens recentes da Diretoria de Hidrografia e Navegação no setor de Recife, o talude continental, muito abrupto em sua parte superior, depois da ruptura do declive da plataforma continental, assume uma inclinação mais suave a partir de 500 m. (ver mapa da Fig. 2 e perfil da Fig. 3 em Kempf, Mabesoone e Tinoco, no prelo). Tais fundos, entre 500 e 1000 m, geralmente ocupados por lama, são propícios ao arrasto e, de modo algum, desprovidos de espécies de valor comercial, como demonstra por exemplo o trabalho de Maurin (1968) para o Atlântico Oriental e o Mar Mediterrâneo. Em condições semelhantes, crustáceos e peixes são comumente explorados em vários mares. A título de indicação, o navio de pesquisas norte americano "Atlantis II", de Woods Hole, embora sem objetivo comercial, capturou camarões nesta faixa em frente a Recife em fevereiro 1967 (comunicação pessoal do chefe da missão).

REFERÊNCIAS

- CAVALCANTI, L. B., COELHO, P. A., KEMPF, M., MABESOONE J. M. e SILVA, O. C. da, 1966. Primeiros resultados das pesquisas oceanográficas nas costas de Alagoas e Sergipe. *Instituto Oceanográfico, Univ. Fed. Pernambuco*, 22 p. (relatório não publicado).
- , 1967. Shelf off Alagoas and Sergipe (NE Brazil). I. Introduction. *Trabs. Inst. oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco*, 7-8: 137-150.

CHALUMEAU, P. 1964. Un engrais marin: le maerl. *Cah. Ingén. agron. Paris*, 191: 29-31.

FOREST, J., 1966. Compte rendu et liste des stations (Campagne de la "Calypso" au large des côtes atlantiques de l'Amérique du Sud, 1961-1962). *Ann. Inst. océanogr.* 44: 329-350.

KEMPF, M., no prelo a. Nota preliminar sobre os fundos costeiros da região de Itamaracá (N do Estado de PE). *Trabs. oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco*, 9-11 (1967-1969).

———, no prelo b. Note on the benthic bionomy of N-NE Brazilian shelf. *Marine Biology*.

———, COUTINHO, P. N. e MORAIS, J. O., 1968. A plataforma continental do N-NE do Brasil: nota preliminar sobre a natureza do fundo D.H.N. *Marinha do Brasil, Rio, D.G.* 26 (XI): 579-600.

KEMPF, M., MABESOONE, J. M. e TINOCO, I. M., no prelo. Estudo da plataforma continental da área do Recife. I. Nota preliminar sobre a natureza do fundo. *Trabs. oceanogr., Univ. Fed. Pernambuco*, 9-11 (1967-1969).

LABOREL, J., 1967. *Les peuplements de madréporaires des côtes tropicales du Brésil*. Thèse AO. 1856., Fac. Sci. Marseille: 331 p.

MABESOONE, J. M. e TINOCO, I. M., 1967. Shelf off Alagoas and Sergipe (NE Brazil). II. Geology. *Trabs Inst. oceanogr. Univ. Fed. Pernambuco*, 7-8: 151-186.

MAURIN, C., 1968. Ecologie ichthyologique des fonds chalutables atlantiques (de la Baie Ibéro-Marocaine à la Mauritanie) et la Méditerranée occidentale. *Rev. Trav. Inst. Pêches marit.* 32 (1): 147 p.

REBOUÇAS, A. C., 1962. *Repartição dos sedimentos na Baía de Tamandaré*. Tese graduação. Escola Geol., Univ., Recife, 59 p. (manuscrito).

———, 1967. Sedimentos da Baía de Tamandaré, Pernambuco. *Trabs. Inst. oceanogr., Univ. Fed. Pernambuco*. 7-8: 187-202.

LISTA DAS ESTAÇÕES

EST.	DATA	N.º DRAG.	POSIÇÃO		PROF. (m)	NATUREZA DE FUNDO
			LAT. S	LONG. W		
PERNAM- BUCO						
01	06.11.68	2	08°50'0	35°06'0	10-12	S
01B	09.11.68	1	08°47'5	35°05'2	11	SM
02	07.11.68	1	"	35°04'5	20	S/CA
03	08.11.68	1	"	34°55'0	36	CA
04	09.11.68	1	"	34°47'0	64-70	CA
05	11.11.68	1	08°40'0	35°02'2	10	S
06	23.11.68	2	"	35°00'2	19	S
06C	"	1	08°37'7	35°01'2	13	M
07	13.11.68	1	08°40'0	34°53'0	35	CA
08	"	1	"	34°45'7	70-90	CA
09	20.11.68	1	08°30'0	34°58'0	9	MS
10	21.11.68	1	"	34°56'7	19	M
11	26.11.68	1	"	34°49'7	33-34	CAh
12	27.11.68	1	"	34°44'2	58-59	CA
13	28.11.68	2	08°20'0	34°55'5	13-14	S
14	29.11.68	3	08°19'0	34°52'8	20-24	S
15	30.11.68	2	08°20'0	34°46'5	35-36	CAh
16	11.02.69	2	08°20'0	34°39'0	73-74	CA
17	29.01.69	2	08°10'0	34°51'5	13-17	S
18	30.01.69	3	08°13'2	34°53'2	15-18	SM
19	31.01.69	1	08°10'0	34°42'0	36-37	CA
21	03.02.69	3	08°00'0	34°47'5	19	S/CA
22	04.02.69	3	"	34°47'5	20-24	CA

EST.	DATA	N.º DRAG.	POSIÇÃO		PROF. (m)	NATUREZA DE FUNDO
			LAT. S	LONG. W		
23	05.02.69	2	"	34°39'7	33	CA
24	07.02.69	2	"	34°32'2	70-80	CA
25	27.02.69	1	07°50'0	34°46'7	11-12	S/Rec.
26	"	1	"	34°44'5	19-20	S/CA
27	03.02.69	2	07°50'8	34°42'0	30	AC
29	25.02.69	2	07°45'0	34°46'8	14-15	S
29B	"	1	07°44'0	34°46'7	"	S
29C	"	2	07°42'0	34°46'5	"	S
30	26.02.69	2	07°45'0	34°43'5	19-20	S/CA
31	07.03.69	1	07°44'3	34°37'3	33	CA
33	13.02.69	2	07°39'0	34°45'5	9-10	S
33B	07.03.69	1	07°36'0	34°46'0	18-19	SM
34	04.03.69	3	07°40'2	34°43'2	19-20	S/CA
35	07.03.69	2	07°39'0	34°37'5	32	CA
36	14.02.69	2	07°40'0	34°28'7	60-88	CA
AKAROA						
01	10.09.65	1	08°56'2	35°07'7	21	SM
02	"	1	"	35°02'7	32	CA
03	"	2	"	34°57'7	36	CAh
04	"	2	"	34°52'7	44	CA
05	"	1	09°01'0	34°51'2	46	CA
05A	"	1	"	"	54	CAh
06	"	1	09°01'2	34°56'3	40	CA
07	"	1	09°01'5	35°01'3	36	CAh
08	"	1	09°01'7	35°06'5	36	CAh

EST.	DATA	N.º DRAG.	POSIÇÃO		PROF. (m)	NATUREZA DE FUNDO
			LAT. S	LONG. W		
09 CANOPUS	"	1	09°02'0	35°10'2	20	MS
75	16.12.65	1	09°00'0	34°51'0	54	CA
76	"	1	08°50'0	34°47'4	53	CA
77	"	1	08°42'0	34°47'0	58	CA
78	"	1	08°34'0	34°44'0	50	CA
79	17.12.65	1	08°27'0	34°41'9	58	CA
83	19.12.65	1	07°50'0	34°30'0	67	CA
84	"	1	07°40'0	34°29'0	54	CA
85	20.12.65	1	07°30'0	34°28'5	63	CAh
118	15.03.66	1	08°56'0	34°49'8	51	CAh
119	"	1	09°01'0	34°51'0	72	CA/O
SALDANHA						
1647	06.10.67	1	07°30'0	34°40'3	19	CA
1647A	"	1	"	34°34'7	37	CA
1648	"	1	"	34°32'0	37	CA
1649	"	1	07°26'0	34°30'0	51	CAh

SÍMBOLOS:

Rec: (reefs) recifal
M: (mud) lama
SM: (sandy mud) lama arenosa
MS: (muddy sand) areia com lama
S: (sand) areia

S/CA: (transition) transição
CA: (cal. algae) algas calcárias
CAh: *Halimeda*
CA/O: (transition) transição
O: (organic material) orgânico

PERFIL DA PLATAFORMA (RECIFE) - Fig. 3

(Segundo KEMPF, no prelo, simplificado)