ISSN: XXXX-XXXX

Revista Brasileira de Geografia Física

Homepage: www.ufpe.br/rbgfe

Prospecção do Nordeste brasileiro para a incidência da mosca-das-frutas em cenários de mudanças climáticas

Jéssica Faria Costa¹; Thieres George Freire da Silva²

¹Mestre em Produção Vegetal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Serra Talhada - PE, jfcosta1990@gmail.com, ²Professor da área de Agrometeorologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Serra Talhada - PE, Autor correspondente, e-mail: thiergeoffissional@hotmail.com

Artigo recebido em 18/05/2016 e aceito em 07/09/2016.

RESUMO

A região Nordeste é a principal produtora de frutas tropicais do Brasil. Dentre as pragas que afetam a fruticultura, as moscas-das-frutas são as de maior expressão econômica, e os fatores climáticos são determinantes na dinâmica populacional desse inseto. Objetivou-se avaliar como as mudanças climáticas afetarão a incidência da mosca-das-frutas, de acordo com os cenários previstos para o Nordeste. Utilizaram-se valores mensais históricos de temperatura e precipitação de 1961 a 1990 de 2.102 localidades. Modelos matemáticos foram usados com o intuito de calcular indicadores de ocorrência da praga: duração do ciclo da mosca-das-frutas (DCM), taxa de redução de gerações (TRG), número de gerações da mosca-das-frutas (NGM) e índice de variação sazonal da mosca-das-frutas (IVSM). Os incrementos de temperatura do ar dos cenários de mudanças climáticas A2 e B2 (2070-2100), propostos pelo IPCC regionalizados para o Nordeste brasileiro, foram usados para estimativa dos indicadores referentes aos cenários atual e futuros. Os resultados revelaram que a precipitação regional, no cenário atual, afeta menos de 10% na TRG em áreas onde o nível pluviométrico é baixo, podendo atingir valores superiores a 40% em locais mais chuvosos. Para o cenário futuro, espera-se redução pronunciada da DCM, com valores abaixo de 15 dias. Combinando o efeito do incremento de temperatura com o da TRG, constatou-se a maior incidência da praga com NGM atingindo valores entre 20 e 25, porém com maior sazonalidade ao longo do ano (IVSM > 1) em algumas áreas do Nordeste, podendo ocasionar maiores danos aos frutos e prejuízos econômicos aos fruticultores.

Palavras-chave: fruticultura, praga, modelagem, regionalização.

Prospecting of the Brazilian Northeast to the incidence of fly-of-fruit on climate change scenarios

ABSTRACT

The Northeast region is the main producer of tropical fruit from Brazil. Among the pests that affect fruit trees, the fruit-flies are the most economic expression, and climatic factors determine the population dynamics of this insect. This study aimed to assess how climate change will affect the incidence of fruit-fly, according to climate change scenarios predicted for the Northeast. We used historical monthly values of temperature and rain for the period 1961-1990, of 2,102 locations. Mathematical models were used in order to calculate indicators of pest occurrence: DCM (duration of the fruit-fly cycle), TRG (rate reduction generations), NGM (number of generations of fruit-fly) and IVSM (index of seasonal variation in fruit-flies). The air temperature increments of climate change scenarios A2 and B2, proposed by the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) regionalized for the Brazilian Northeast, were used to estimate future scenarios of DCM, NGM and IVSM, regarding the current and future scenarios (2070-2100). The results revealed that regional rain in the current scenario, affects less than 10% in TRG in areas where rainfall is low level, reaching values higher than 40% in the wettest places. For the future scenario is expected pronounced reduction of DCM, with values below 15 days. Combining the effect of increase of temperature with the TRG, there was a higher incidence of the pest, NGM reaching values between 20-25, but with greater seasonality throughout the year (IVSM > 1) in some areas of the Northeast, which can cause damage to fruit and fruit grower's economic losses.

Keywords: fruit grower, pest, modeling, regionalization.

Introdução

O Brasil se destaca como o terceiro maior produtor de frutas no ranking mundial, com colheita superior a 40 milhões de toneladas de frutas frescas

desde 2004, ficando atrás apenas da China e da Índia (Santos et al., 2013).

No que tange a fruticultura, existem no Brasil cerca de 30 polos distribuídos de Norte a Sul,

abrangendo mais de 50 municípios. A Região Nordeste, mediante a participação dos seus polos irrigados é a principal produtora e exportadora de frutas tropicais frescas do Brasil (Lopes et al., 2009). As áreas de destaque no Nordeste brasileiro são o Baixo Jaguaribe-CE, Assu e Mossoró-RN, Alto Piranhas-PB, Juazeiro-BA, Petrolina-PE, e Sul de Sergipe, pois apresentam vantagens naturais para a produção de frutas de padrão internacional o ano inteiro (Bustamante, 2009).

Dentre as pragas que afetam a fruticultura, a mosca-das-frutas é a de maior expressão econômica. Está presente tanto em cultivo convencional como no protegido (Chavarria et al., 2009) e em alguns locais a mesma ocasiona perda total das frutas, inviabilizando a prática da fruticultura (Carvalho, 2005). Dentre os danos diretos podem ser citados a diminuição da produção, desvalorização das frutas e o aumento dos custos devido ao controle (Felix et al., 2009); indiretamente, o dano está associado ao fato de serem consideradas pragas quarentenárias (Paranhos et al., 2007).

As espécies de moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil pertencem aos gêneros *Anastrepha* Schiner, 1868 e *Ceratitis* MacLeay, 1829 (Zucchi, 2000a). *Anastrepha* é o gênero que engloba o maior número de espécies, das quais sete são particularmente importantes do ponto de vista econômico. A maioria dessas espécies são polífagas, onde uma mesma espécie infesta grande diversidade de hospedeiros. São registradas no país 112 espécies de *Anastrepha* com 38 famílias de plantas hospedeiras identificadas, sendo as mais infestadas Myrtaceae, Sapotaceae, Anacardiaceae e Passifloraceae (Zucchi, 2008). O gênero *Ceratitis* é representado pela espécie *C. capitata*, sendo a única espécie do gênero existente no país. É a espécie mais cosmopolita e invasora dentre todos os tefritídeos (Malavasi, 2009).

O período de duração do ciclo de vida das moscas-das-frutas é dependente de vários fatores, sobretudo da temperatura e da própria espécie de mosca. *Ceratitis capitata* apresenta a duração do seu ciclo de ovo a adulto em torno de 18 a 30 dias no verão, enquanto que *Anastrepha fraterculus* varia de 25 a 35 dias (Raga e Souza Filho, 2000; Salles, 1994). O ciclo evolutivo completo desse inseto dura aproximadamente 31 dias. As fêmeas podem viver até 10 meses, ovipositando até 800 ovos durante este período (Gallo et al., 2002). Todavia, essa duração está diretamente relacionada com a temperatura; quanto mais elevada, dentro da

faixa limítrofe de desenvolvimento, menos dias são necessários para a mosca completar o seu ciclo de vida.

Os danos da mosca-das-frutas são causados diretamente nos frutos pelas fêmeas adultas que perfuram o fruto por ocasião da oviposição, e pelas larvas, que consomem a polpa, provocando apodrecimento interno. Em pomares não tratados, a perda de frutos pode chegar a 100%, dependendo da espécie cultivada (Raga e Souza Filho, 2000).

As regiões tropicais e subtropicais apresentam grande diversidade de frutos hospedeiros de moscas-das-frutas, o que favorece o desenvolvimento de espécies multivoltinas, uma vez que terão hospedeiros em abundância durante todo o ano. *C. capitata* é um exemplo típico para este caso. No Nordeste do Brasil tem importância acentuada nos pomares comerciais de manga, onde se adaptou muito bem nas duas últimas décadas (Malavasi, 2009).

Devido a sua importância como praga, vários métodos de controle são utilizados, dentre eles o monitoramento desses tefritídeos. Que permite a identificação e verificação da distribuição das espécies pragas e o estabelecimento de programas de erradicação e manejo integrado (Nascimento et al. 2000). Com o conhecimento das espécies pragas e sua flutuação populacional, é possível determinar épocas de maior ocorrência e assim realizar um controle eficiente (Ronchi-Teles e Silva, 2005).

Segundo Braga Sobrinho et al. (2001) A principal maneira para que o manejo integrado das moscas-das-frutas seja eficiente é a harmonização da associação do controle biológico, químico, cultural e genético.

O entendimento da dinâmica populacional é base para o manejo integrado de pragas, e os fatores abióticos são de grande importância nesse contexto, especialmente a temperatura, pois os insetos se desenvolvem e acumulam energia a partir de um limite térmico inferior, sendo assim possível a previsão de ocorrência (Cividanes e Parra, 1994). Determinando-se as exigências térmicas de insetos pode-se prever o seu tempo de desenvolvimento, bem como o número de gerações que podem ocorrer, subsidiando dessa forma estratégias de manejo (Rabb et al., 1984).

Diversos trabalhos relatam a influência dos fatores climáticos no comportamento e na dinâmica populacional da mosca-das-frutas, especialmente a temperatura do ar e do solo, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica

(Bateman, 1972; Lara et al., 1977; Araujo e Zucchi, 2003).

A umidade e a temperatura podem ser determinantes na população de tefritídeos (Bateman, 1972). A temperatura pode influir direta ou indiretamente por meio de efeitos sobre as taxa de desenvolvimento, mortalidade e fecundidade.

Em estudos da dinâmica populacional de moscas-das-frutas, Nascimento et al., (1982) verificaram que as temperaturas (médias e máxima) e a umidade do ar influíram na coleta de *Anastrepha*. Estudos sobre moscas-das-frutas em Presidente Prudente, SP, mostrou que a flutuação populacional de *Anastrepha* spp, correlacionou negativamente com a precipitação pluviométrica e com as temperaturas (média e mínima) e a flutuação de *C. capitata* com a umidade relativa (Raga et al., 1996).

A precipitação pluvial aliada a disponibilidade de hospedeiro também são fatores determinantes na população de tefritídeos, pois os meses seguintes às maiores precipitações pluviais e o período de maior frutificação da goiaba em Mossoró, RN, foram justamente os meses de maiores picos populacionais e níveis de infestação (Araujo e Zucchi, 2003).

De modo geral, a temperatura é o fator abiótico que mais influencia no seu desenvolvimento, e, à medida que essa aumenta, a partir de sua temperatura basal, o desenvolvimento também tende a ser mais rápido, até atingir seu ótimo e, posteriormente, tender ao seu declínio, o que irá afetar a dinâmica da população (Wigglesworth, 1972).

Como os fatores climáticos influenciam de maneira decisiva na atividade biológica de pragas, variações e mudanças climáticas globais podem alterar os padrões de distribuição e severidade do ataque destes organismos, seja entre safras ou décadas (Ghini et al., 2007). Os efeitos dessas mudanças podem ser favoráveis ou desfavoráveis aos organismos, gerando migrações, aumento na abundância ou extinções, e modificando os padrões atuais de distribuição (Chakraborty, 2005).

De acordo com o IPCC várias são as projeções de mudanças climáticas que se baseiam nas combinações de alterações das variáveis meteorológicas, sociais e econômicas (IPCC, 2001). Assim, pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de avaliar os efeitos de cenários futuros sobre o setor agropecuário (Hamada et al., 2013; Silva et al., 2009, 2010). Para praga agrícola, Hamada et al. (2006) estudaram o efeito das mudanças climáticas para o bicho-mineiro-do-

cafeeiro (*Leucoptera coffeella*), comparando as condições climáticas atuais com as futuras, e observaram aumento no número provável de ciclos deste inseto para o futuro. Por sua vez, Ghini et al. (2007) utilizaram os cenários do IPCC de projeções para 2099, visando estudar os impactos das mudanças climáticas sobre a sigatoka-negra da bananeira (*Mycosphaerella fijiensis*) no Brasil, e constataram redução da área favorável a esta doença no país.

Com as alterações nos fatores climáticos é possível que haja aumento populacional da mosca-das-frutas, em decorrência do incremento da temperatura do ar favorecer que a praga atenda mais rapidamente a sua exigência térmica, resultando maior número de gerações.

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar como as mudanças climáticas afetarão a incidência da mosca-das-frutas, de acordo com os cenários de mudanças climáticas previstos para o Nordeste brasileiro.

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi conduzido para o Nordeste brasileiro, cuja área tem aproximadamente 1.600.000 km², equivalente a 18% do território nacional. Apresenta temperatura média elevada (23 a 27°C), insolação média de 2.880 h ano⁻¹, evaporação média anual superior a 2.000 mm, e precipitações pluviais bastante variáveis, de inferior a 800 mm ano⁻¹ no semiárido, até o clima chuvoso, observado principalmente na costa leste, com precipitação acumulada anual superior a 1.500 mm e litoral norte da Região que recebe entre 1.000 e 1.200 mm ano⁻¹ (Moura et al., 2007; Marengo e Dias, 2007).

Dados climáticos

Utilizou-se dados históricos mensais de precipitação e os valores observados e estimados de temperatura (t_m) referentes ao período de 1961 a 1990, de 2.102 localidades, situadas no Nordeste; desse total, 74 são estações meteorológicas convencionais, vinculadas ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e as demais (2028) são postos pluviométricos, pertencentes à Rede Hidrometeoro-lógica da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

A complementação do banco de dados climáticos dos postos pluviométricos foi feita por equações de estimativa dos valores históricos

normais de temperatura, que consideraram os dados geográficos (latitude, φ ; longitude, λ ; altitude, h) dos 2.028 postos pluviométricos e equações propostas por Alvares et al. (2012).

Indicadores do desenvolvimento da mosca-das-frutas

A duração em dias do ciclo de vida da mosca-das-frutas (DCM) foi determinada com base

$$DCM = \begin{cases} Se \left\{ \left(\frac{GDA}{\left(\frac{T_x + T_n}{2} \right)} \right) - Tb \right\} < 30 \text{ dias}, & \left\{ \left(\frac{GDA}{\left(\frac{T_x + T_n}{2} \right)} \right) - Tb \right\} \cdot fp(\leq 30^\circ C) \\ Se \left\{ \left(\frac{GDA}{\left(\frac{T_x + T_n}{2} \right)} \right) - Tb \right\} \geq 30 \text{ e } \leq 40 \text{ dias}, & \left\{ \left(\frac{GDA}{\left(\frac{T_x + T_n}{2} \right)} \right) - Tb \right\} \cdot fp(> 30^\circ C) \\ Se \left\{ \left(\frac{GDA}{\left(\frac{T_x + T_n}{2} \right)} \right) - Tb \right\} > 40 \text{ dias}, & 0 \end{cases}$$

(1)

onde, GDA = Graus dias acumulado, igual a $250^\circ C \text{dia}$; T_x = temperatura média máxima; T_n = temperatura média mínima; T_b = temperatura basal inferior.

De tal modo que, acima ou abaixo da temperatura ótima para o desenvolvimento do

inseto ($30^\circ C$) e até os valores críticos inferior ($13,5^\circ C$) ou superior ($40^\circ C$) do inseto há redução da taxa de desenvolvimento. Abaixo ou acima desses valores críticos, nessa ordem, o inseto não se desenvolve.

Figura 1. Taxa de desenvolvimento do inseto em função da temperatura do ar, segundo Pereira et al. (2002).

A taxa de redução de geração (TRG) da mosca-das-frutas foi definida com base no nível

pluviométrico local, assumindo os dados publicados por Feitosa et al. (2008). Na TRG foram

consideradas relações matemáticas entre a fração relativa de insetos e a lâmina de água precipitada, como demonstrada na Figura 2. Matematicamente, essa relação foi descrita conforme a Eq. 2. O número de gerações da mosca-das-frutas (NGM) foi feito pela relação entre o número de dias do ano

e os valores de DCM (Eq.3). Finalmente, o índice de variabilidade sazonal da moscas-das-frutas (IVSM) foi calculado pela relação entre a média do DCM anual, e a amplitude do DCM mensal, ou seja, a diferença entre os valores máximos e mínimos mensais do NGM (Eq.4).

$$TRG \begin{cases} Se - 0,0018 \times P + 1 < 0,0 \\ Se - 0,0018 \times P + 1 \geq 0 \end{cases} = -0,0018 \times P + 1 \quad (2)$$

$$NGM \begin{cases} Se DCM \leq 0,0 \\ Se DCM > 0, \quad \frac{365}{DCM} \cdot TRG \end{cases} \quad (3)$$

$$IVSM \begin{cases} Se DCM \text{ maximo mensal} \leq 0,0 \\ Se DCM \text{ maximo mensal} > 0 \end{cases} = \frac{DCM \text{ média anual}}{DCM \text{ máximo mensal} - DCM \text{ mínimo mensal}} \quad (4)$$

Figura 2. Taxa de incidência de gerações de mosca-das-frutas em função da precipitação pluviométrica mensal, de acordo com dados de Feitosa et al. (2008).

Cenários de mudanças climáticas

Foram assumidos dois cenários de mudanças climáticas propostos pelo IPCC (2007), sendo o cenário B2, considerado otimista e o cenário A2, pessimista, que consideram incrementos na temperatura do ar. Os dados foram extraídos de simulações do modelo HadRM3 para os períodos de referência 1961 a 1990 (cenário atual) e 2070 a 2100 (cenários futuros, B2 e A2). Dependendo do cenário adotado, esses incrementos foram adicionados aos valores médios atuais de temperatura mensal (t_m) observados ou estimados para as 2.102 localidades avaliadas.

Admitiu-se que as normais atuais de precipitação permanecerão inalteradas até o final do século em decorrência de suas incertezas quanto aos cenários A2 e B2 para o Nordeste do Brasil. Logo, a taxa de redução de gerações (TRG) não foi

alterada nos cenários futuros, e os seus valores em conjunto com as projeções de t_m foram utilizados na estimativa da duração do ciclo da mosca-das-frutas (DCM), número de gerações da mosca-das-frutas (NGM) e do índice de variação sazonal da mosca-das-frutas (IVSM) para os cenários A2 e B2, conforme metodologia definida e, os resultados foram comparados ao período de referência.

Resultados e discussão

Os mapas mensais da duração do ciclo da mosca-das-frutas (DCM) para o período de referência (1961-1990) e cenários futuros são demonstrados nas Figuras 3, 4 e 5. Percebe-se que no período de referência (Figura 3), a DCM mensal, de modo geral, é inferior a 25 dias, sobretudo nas áreas mais ao norte da

Figura 3. Duração, em dias, do ciclo da mosca-das-frutas (DCM) para o período de referência (1961-1990).

Figura 4. Duração, em dias, do ciclo da mosca-das-frutas (DCM) para o cenário de baixas emissões (otimista IPCC - B2 para o período de referência de 2070 a 2100).

Figura 5. Duração em dias do ciclo da praga mosca-das-frutas para o cenário futuro de altas emissões (pessimista IPCC - A2 para o período de referência de 2070 a 2100).

Região Nordeste, contemplando com maior abrangência, os estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, em praticamente todos os meses do ano. Nas latitudes maiores, observa-se que a DCM tende a aumentar, devido os maiores valores de temperatura do ar, que diminui a taxa de desenvolvimento da espécie, quando comparada às latitudes menores. Porém, nos meses mais frios dessas áreas há uma redução drástica da DCM, por causa da diminuição da temperatura do ar estar mais próxima da faixa ótima de desenvolvimento da espécie. Assim, a DCM reduz para valores menores do que 15 dias. Essa situação é mais ocorrente nas áreas do centro-sul da região Nordeste.

O aumento da temperatura média para níveis favoráveis à ocorrência da moscas-das-frutas, ou seja, valores acima de 20°C, também têm sido relatado por Garcia et al. (2003), em pomares no Oeste de Santa Catarina, onde a temperatura máxima atuou de forma positiva, enquanto a temperatura mínima, de forma negativa sobre a flutuação populacional de *A. fraterculus*.

Os limites usados para caracterizar as condições favoráveis à ocorrência da moscas-das-frutas mostraram-se adequados, pois as figuras elaboradas para as condições atuais estão de acordo com os relatos na literatura. Segundo Silveira Neto

et al. (1976) e Salles (1994), em temperaturas abaixo de 13,5°C há paralisação no desenvolvimento do inseto e em temperaturas superiores a 38°C, este desenvolvimento tende a ser mais lento. Os mesmos autores relatam que temperaturas em torno de 22 a 26°C são a faixa ótima de desenvolvimento deste inseto.

Para os cenários futuros, notou-se que no cenário mais otimista, com menores aumentos na temperatura do ar (B2) (Figura 4), a DCM apresentou valores menores, nos meses mais quentes das áreas ao norte da Região. Por outro lado, no centro-sul ao litoral verificou-se aumento da DCM como reflexo do aumento da temperatura acima da faixa ideal para o inseto. Com o cenário A2 esses resultados foram intensificados, todavia os meses com ocorrência de maiores durações do ciclo foram reduzidos (Figura 5).

As Figuras anuais de duração do ciclo da moscas-das-frutas (DCM) (Figura 6) indicam que, de um modo geral, haverá diminuição na duração em dias do ciclo da mosca-das-frutas tanto para o cenário A2 quanto para o B2 em relação ao clima avaliado, indicando que quanto menor a duração do ciclo, mais gerações serão formadas por ano, o que pode indicar uma maior incidência da praga, por conta do aumento da temperatura, sendo favorável o seu desenvolvimento.

Figura 6. Duração em dias do ciclo da praga mosca-das-frutas para o período de referência (1961-1990) (A) e cenários futuros (período de referência de 2070 a 2100) de baixas (otimista - B2) (B) e altas emissões (pessimista - A2) (C).

A redução dos valores de DCM possui influência preponderante no número de gerações da praga, mas a mesma também depende do efeito dos níveis pluviométricos. Tal relação foi estabelecida

por meio da taxa de redução de gerações (TRG), demonstrada na Figura 7.

Constata-se que regiões onde ocorre alta precipitação pluviométrica há diminuição na incidência da mosca-das-frutas, explicado pelo fato da mosca-das-frutas manter pupários no solo, e

estes com a ação mecânica das chuvas serem lavados, diminuindo a emergência da praga.

Figura 7. Taxa de redução do número de gerações das moscas-das-frutas em função da precipitação do Nordeste para o período de referência (1961-1990).

Resultados semelhantes foram constatados por Dimou et al. (2003), em estudo avaliando a profundidade de pupação de *Bactrocera (Dacus) oleae*, onde verificaram que nos casos em que a umidade do solo se aproximava de 100%, em decorrência dos eventos de chuva, a falta de oxigênio induziu a pupação de larvas de tefritídeos na superfície do solo. Feitosa et al. (2008) relatou que, em pomar de manga no Piauí, a diminuição da precipitação pluviométrica resultou na maior captura das moscas-das-frutas. Verificando então que os eventos de precipitação estão relacionados com a abundância de captura de moscas-das-frutas, onde os meses de maior precipitação são decorridos de eventos de menor captura de moscas das frutas (Moura e Moura, 2006), assim como eventos de baixa precipitação e umidade são decorridos de aumentos de captura de moscas (Thomas, 2003).

O litoral Nordestino e Noroeste do Maranhão apresentam valores de TRG superiores a 40%, o que significa que os eventos de chuva nessas áreas são responsáveis pela redução em 40% no número máximo de gerações da praga. Nas áreas onde a precipitação é baixa, representada na figura pela área mais escura (Semiárido brasileiro), a TRG é inferior a 10%, podendo essas áreas serem mais vulneráveis à incidência das moscas-das-frutas.

Como nos cenários futuros não foram considerados as anomalias da precipitação pluviométricas, os valores de TRG foram considerados constantes para os mesmos. Com isso, o efeito combinado da temperatura do ar, nos valores de DCM, e da precipitação, na TRG, possibilitou a estimativa da NGM (Figura 8). Observou-se que o número de gerações das moscas-das-frutas (NGM) durante o ano, no cenário atual, é elevado, até 15 gerações, na maior parte da Região, porém algumas áreas apresentam valores de até 20 gerações (Figura 8A). Conforme Salles (1995), as moscas-das-frutas apresentam no mínimo seis gerações por ano. Contudo, o NGM pode sofrer alterações de acordo com as mudanças climáticas apresentadas, como demonstradas nas Figuras 8B e 8C, nos cenários B2 e A2, respectivamente. No cenário B2 houve um aumento do número de gerações, destacando-se a faixa de 15 a 20 gerações por ano, e aumento das áreas com 20 a 25 (Figura 8B). Com a intensificação do regime térmico, no cenário A2, a classe de 20 a 25 gerações por ano ganhou destaque para a Região (Figura 8C).

Como observado nos mapas do número de gerações das moscas-das-frutas (Figura 8B e 8C), é previsto um agravamento na incidência de moscas em toda a região do Nordeste, principalmente na região do Semiárido Nordestino, que culminam com as áreas de grande produção de frutas, como o

Vale do São Francisco, com a agricultura irrigada, grande centro produtor de uvas finas de mesa e manga do país (CODEVASF, 2006).

Figura 8. Número de Gerações das moscas-das-frutas anual para o período de referência (1961-1990) (A) e cenários futuros (período de referência de 2070 a 2100) de baixas (otimista - B2) (B) e altas emissões (pessimista - A2) (C).

Os valores mensais do NGM resultaram o índice de variabilidade sazonal da mosca-das-frutas (IVSM) (Figura 9). Por essa Figura, percebe-se que valores próximos de 1 indicam menor variação na duração do ciclo da mosca, consequentemente, maior presença da mesma ao longo do ano. Por outro lado, valores que se afastam de 1 representam maior variação da duração do ciclo da mosca ao longo do ano, ou seja,

indicando períodos com maior ocorrência da praga, e outros com menor.

Na figura do cenário atual (Figura 9A), nota-se que todo o Nordeste apresenta uma baixa variabilidade na duração do ciclo durante o ano, devido às condições ambientais propiciar uma maior regularidade entre os ciclos, tendo assim a presença da mosca-das-frutas durante todo o ano.

Figura 9. Índice de variabilidade sazonal da moscas-das-frutas para o período de referência (1961-1990) (A) e cenários futuros (período de referência de 2070 a 2100) de baixas (otimista - B2) (B) e altas emissões (pessimista - A2) (C).

No cenário futuro é verificado o surgimento de áreas em que há uma maior variação na duração do ciclo ao longo do ano. Essa variabilidade sazonal é verificada com maior intensidade no cenário B2, devido as mudanças na

temperatura permitirem uma maior variação na duração o ciclo das moscas-das-frutas. Evidências são observadas mais na região Norte, contemplando maiores áreas nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, no

cenário mais otimista (Figura 9B). Com o cenário A2, há uma redução das áreas com maior variabilidade sazonal da praga ao longo do ano (Figura 9C).

As mudanças climáticas têm propiciado também o estabelecimento e o aumento de espécies de moscas-das frutas na região, como a mosca *C. capitata*, espécie-praga mais polífaga do mundo. Introduzida no Brasil no início do século XX, esta espécie ocorre em vários Estados brasileiros, associada a 58 espécies de frutíferas (Zucchi, 2001). Tem como hospedeiros preferenciais à família *Anarcadiaceae*, com a manga (*Mangifera indica*), sendo considerada a principal praga dessa cultura nas Américas (Weens Jr. et al., 2001).

Onde nota-se que antes da década de 90, a frequência de *C. capitata* era bem inferior do que se vem observando nos trabalhos atuais. Por um período de quatro anos consecutivos de monitoramento populacional de moscas-das-frutas no Recôncavo Baiano. Nascimento e Zucchi, (1981), relataram uma frequência de 0,71% para *C. capitata* contra 99,3 de *Anastrepha* spp. (mosca nativa). Pesquisas realizadas por Araújo et al. (2005) na região de Mossoró-RN e/ Assu-RN, encontraram um percentual de 82,3 % de *C. capitata*, em relação às espécies de *Anastrepha* (17,7%). Esses autores consideraram esse registro de alta relevância, uma vez que *C. capitata* não havia sido detectada na região até 1993 (Araújo et al., 2000).

Esse aumento populacional de *C. capitata* nos pólos de fruticultura na região Nordeste do Brasil a partir dos anos 1980, pode ser atribuído à expansão das áreas comerciais cultivadas com diferentes espécies frutíferas nas áreas irrigadas e a um conjunto de fatores climáticos favoráveis à espécie, propiciado pelo aumento de temperatura previsto nos relatórios do IPCC em relação ao período de referência de 1990.

O aumento populacional das moscas das frutas no Nordeste, como mostrado nas figuras e confirmado nos trabalhos de Araújo et al. (2005), pode trazer sérios prejuízos econômicos aos produtores de frutas do Nordeste, como por exemplo a manga. Onde grande parte dos pomares de manga está concentrada na região Nordeste, com área cultivada de 55.297 ha, produção de 970.786 t, correspondendo a 76,31% da produção de manga do país (IBGE, 2009), com destaque para o Estado da Bahia e Pernambuco, representadas pela Mesorregião do Centro-Sul Baiano e do Vale do Submédio São Francisco. Esta é a mais importante região de produção irrigada de frutas no Brasil, com grande parte da produção voltada ao mercado externo e ao interno mais exigente. Outras regiões importantes são o Vale do Rio Açu no Rio

Grande do Norte e o Platô de Neópolis em Sergipe (IBGE, 2009).

Conclusões

Com o incremento de temperatura do ar previsto para os cenários B2 e A2 do IPCC, a duração do ciclo da mosca-das-frutas (DCM) poderá ser reduzida, resultando em uma maior incidência da praga (NGM), porém com maior sazonalidade ao longo do ano (IVSM > 1), o que pode ocasionar em danos aos frutos e prejuízos econômicos aos fruticultores, ou a necessidade de adoção de métodos de controle, como o manejo integrado das moscas-das-frutas, que visa à harmonização da associação do controle biológico, químico, cultural e genético.

Referências

- A.P. Moura, A. P., Moura, D. C. M., 2006. Espécies de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) associadas à cultura da goiabeira (*psidium guajava linnaeus*) em Fortaleza, Ceará. Arquivo Instituto Biológico 73, 65-71.
- Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, J. L. M., 2013. Modeling monthly mean air temperature for Brazil. Agricultural Water Management [online] 113. Disponível: [http:// dx. doi 10.1007/s00704-012-0796-6](http://dx.doi.org/10.1007/s00704-012-0796-6). Acesso: 21 Fev. 2016.
- Araujo, E. L., Lima, F. A. M., Zucchi, R. A., 2000. Moscas-das-frutas na cultura da manga, in: Malavasi, A., Zucchi, R. A. (Eds.). Moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil. Conhecimento básico e aplicado. Editora Holos, Ribeirão Preto, 327p
- Araujo, E. L., Mayara, K. M., Medeiros, M. K. M., Valdemar, E., Silva, V. E., Zucchi, R. A., 2005. Moscas-das-Frutas (Diptera: Tephritidae) no SemiÁrido do Rio Grande do Norte: Plantas Hospedeiras e Índices de Infestação. Neotropical. Entomology, 889-994.
- Araújo, E. L., Ribeiro, J. C., Chagas, M. C. M., Dutra, V. S., Silva, J. G., 2013. Moscas-Das-Frutas (Diptera: Tephritidae) em um pomar de Goiabeira, no Semiárido Brasileiro. Revista Brasileira de Fruticultura [online] 35. Disponível: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452013000200016>. Acesso: 2 fev. 2016.
- Araujo, E. L., Zucchi, R. A., 2003. Moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em goiaba (*Psidium guajava* L.) em Mossoró, RN. Arquivos do Instituto Biológico 70, 459-465.
- Bateman, M. A., 1972. The ecology of fruit flies. Annual Review of Entomology 17, 493-518.
- Bustamante, P. M. A. C., 2009. A Fruticultura no Brasil e no Vale do São Francisco: Vantagens

- e Desafios. Revista Economia da Natureza 40, 154- 171.
- Carvalho, R. S., 2005. Metodologia para monitoramento populacional de moscas-das-frutas em pomares comerciais. Embrapa Mandioca e Fruticultura, 17 p. (Circular Técnica 75).
- Chakraborty, S., 2005. Potential impact of climate change on plant–pathogen interactions. Australasian Plant Pathology 34, 443-448.
- Chavarria, G.; Zart, M.; Botton, M.; Santos, H. P.; Marodin, G. A. B., 2009. Flutuação populacional de adultos de *Anastrepha fraterculus* (Wied.) em cultivo protegido e convencional de videira. Revista Brasileira de Fruticultura 31, 725-731.
- Cividanes, F. J., Parra, J. R. P., 1994. Zoneamento ecológico de *Nezara viridula* (L.), *Piezodorus guildinii* (West.) e *Euschistus heros* (Fabr.) (Heteroptera: Pentatomideo) em quarto estados produtores de soja no Brasil. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil 23, 219-226.
- CODEVASF. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Disponível: https://www.codevasf.gov.br/CodevasfHoje/2006/jornal_marco_2006.pdf. Acesso: 16 mar. 2016.
- Dimou, I., Koutsikopoulos, C., Economopoulos, A.P., Lykakis, J., 2003. Depth of pupation of the wild olive fruit fly, *Bactrocera* (Dacus) oleae (Gmel.) (Diptera: Tephritidae), as affected by soil abiotic factors. Journal of Applied Entomology 127, 12-17.
- Feitosa, S. S., Silva, P. R. R., Pádua, L. E. M., Carvalho, E. M. S., Paz, J. K. S., Paiva, D. R., 2008. Flutuação populacional de moscas-das-frutas (diptera: tephritidae) associadas a variedades de manga no município de José de Freitas-Piauí. Revista Brasileira de Fruticultura 30, 112-117.
- Felix, C. S., Uchôa, M. A., Faccenda, O., 2009. Capture of *Anastrepha sororcula* (Diptera: Tephritidae) in McPhail and Jackson traps with food attractant and virgin adults. Brazilian Archives of Biology and Technologyv. [online] 52. Disponível: [dx.doi.org/10.1590/S1516-89132009000100013](https://doi.org/10.1590/S1516-89132009000100013). Acesso: 15 fev. 2016.
- Gallo, D., Nakano, O., Neto, S.S., Carvalho, R.P.L., Batista, G.C., Filho, E.B., Parra, J.R.P., Zucchi, R.A., Alves, S.B., Vendramim, J.D., Marchini, L.C., Lopes, J.R.S., Omoto, C., 2002. Entomologia agrícola. FEALQ, Piracicaba.
- Garcia, F. R. M., Campos, J. V., Corseuil, E., 2003. Flutuação populacional de *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann, 1830) (Diptera, Tephritidae) na Região Oeste de Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Entomologia 47, 415-420.
- Ghini, R., Hamada, E., Gonçalves, R. R. V., Gasparotto, L., Pereira, J. C. R., 2007. Análise de Risco das Mudanças Climáticas Globais sobre a Sigatoka-negra da Bananeira no Brasil. Fitopatologia Brasileira 32, 197-204.
- Hamada, E., Ghini, R., Gonçalves, R. R. V., 2006. Efeito da mudança climática sobre problemas fitossanitários de plantas: metodologia de elaboração de mapas. Engenharia Ambiental 3, 73-85.
- Hamada, E., Ghini, R., Gonçalves, R. R. V., Marengo J. A., 2013. Atlas digital dos cenários climáticos futuros projetados para o Brasil com base no Quarto Relatório do IPCC (2007): variáveis de interesse agrícola. Disponível: <http://www.cnpma.embrapa.br/climapest/atlasdigital4r/>. Acesso: 19 mar. 2016
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2009. Disponível: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso: 23 mar. 2016.
- IPCC. Climate change 2007: the physical science basis. Geneva, 2007. 996 p. (Fourth Assessment Report).
- IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001. Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability. Disponível: <https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/>
- Lara, F. M., De Bortoli, S. A., Oliveira, E. A., 1977. Flutuações populacionais de alguns insetos associados ao Citrus sp. e suas correlações com fatores meteorológicos. Científica, Jaboticabal 5, 134-143.
- Lopes, P. R. C., Oliveira, I. V. M., SILVA, R. R. S., 2009. Avaliação do potencial de produção de frutas de clima temperado no Nordeste Brasileiro, in: Semana Internacional Da Fruticultura, Floricultura e Agroindústria, Anais... Fortaleza, 1 CD-ROM.
- Malavasi, A., 2009. Biologia, Ciclo de vida, relação com o hospedeiro, espécies importantes e bioecologia de tefritídeos, in: Malavasi, A.; Virgínio, J. (Ed.). Biologia, monitoramento e controle. Juazeiro, BA, pp.1-5.
- Marengo, J. A., Dias, M. S., 2006. Mudanças climáticas globais e seus impactos nos recursos hídricos, in: Águas doces no Brasil: capitais ecológicos usos múltiplos, exploração

- racional e conservação. 3. ed., USP, São Paulo, pp. 63-109.
- Moura, M.S.B., Galvêncio, J.D., Brito, L.T.de, Souza, L.S.B.de., Sá, I.I.S., Silva, T.G.F.da., 2007. Clima e água de chuva no Semi-Árido. In: BRITO, L.T.L., Moura, M.S.B., Gama, G.F.B. (Orgs.). Potencialidades da Água de Chuva no Semi-Árido Brasileiro. 1 ed. Embrapa Semi-Árido, Petrolina, pp. 37-59.
- Nascimento, A. S., Carvalho, R. S., Malavasi, A., 2000. Monitoramento populacional, in: Malavasi, A.; Zucchi, R. A. (ed.). Moscas-das-frutas de Importância Econômica no Brasil. Editora Holos, Ribeirão Preto, pp 109-112.
- Nascimento, A. S., Zucchi, R. A., Silveira Neto, S., 1983. Dinâmica populacional das moscas-das-frutas do gênero *Anastrepha* (Dip., Tephritidae) no Recôncavo Baiano. III. Análise Faunística. Pesquisa Agropecuária Brasileira 16, 763-767.
- Paranhos, B. A. J., Walder, J. M. M., Alvarenga, C. D., 2007. Parasitismo de larvas da Mosca-do-mediterrâneo por *Diachasmimorpha longicaudata* (Ashmead) (Hymenoptera: Braconidae) em diferentes cultivares de goiaba. Neotropical Entomology 36, 243-246.
- Pereira, A.R., Angelocci, L.R., Sentelhas, P.C., 2002. Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas. Agropecuária, Guaíba.
- Rabb, R. L., Defoliari, G. R., Kennedy, G. G., 1984. An ecological approach to managing insect populations, in: Huffaker, C. B., Rabb, R. L. (Eds). Ecological Entomology. Editora John Wiley, New York, pp. 697-728.
- Raga, A., Souza Filho, M. F., 2000. Manejo e Monitoramento de Moscas-das-Frutas, in: Reunião Itinerante de Fitossanidade do Instituto Biológico, 3 ed., Mogi das Cruzes, SP. Anais... Indaituba, SP.
- Raga, A., Souza Filho, M. F., Sato, M. E., Cerávol, L. C., 1996. Dinâmica populacional de adultos de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em pomar de citros de Presidente Prudente, SP. Arquivos do Instituto Biológico 63, 23-28.
- Ronchi-teles, B., Silva, N. M., 2005. Flutuação populacional de espécies de *Anastrepha Schiner* (Diptera: Tephritidae) na região de Manaus, AM. Neotropical Entomology 34, 733-741.
- Salles, L. A. B., 1994. Mosca das frutas (*Anastrepha* spp) Biologia e controle. Pelotas, EMBRAPA-CNPFT.
- Salles, L. A. B., 1995. Bioecologia e controle da mosca-das-frutas sul-americana. EMBRAPA – CPACT, Pelotas.
- Salles, L. A., 2000. Biologia e ciclo de vida de *Anastrepha fraterculus* (Wied.), in A. Malavasi and R. A. Zucchi (eds) Moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil: Conhecimento básico e aplicado Editora Holos, Ribeirão Preto.
- Santos, C. E., Kist, B. B., Carvalho, C., Reetz, E. R., Marluci Drum, M., 2013. Anuário Brasileiro de fruticulture. Editora Gazeta, Santa Cruz do Sul.
- Silva, T. G. F., Moura, M. S. B., Sá, I. I. S., Zolnier, S., Turco, S. H. N., Justino, F., Carmo, J. F. A., Souza, L. S. B., 2009. Impactos das mudanças climáticas na produção leiteira do estado de Pernambuco: análise para os cenários B2 e A2 do IPCC. Revista Brasileira de Meteorologia 24, 489-50.
- Silva, T. G. F., Moura, M. S. B., Sá, I. I. S., Zolnier, S., Turco, S. H. N., Souza, L. S. B., 2010. Cenários de mudanças climáticas e seus impactos na produção leiteira em estados nordestinos. Revista Brasileira Engenharia Agrícola e Ambiental 14, 863-870.
- Silveira Neto, S., Nakano, O., Barbin, D., Villa Nova, N.A., 1976. Manual de ecologia dos insetos. Editora Ceres, São Paulo.
- Sobrinho, R. B., Malavasi, A., Mesquita, A. L. M., Ometo, A. C. F., 2001. Manual operacional para levantamento, detecção, monitoramento e controle de moscas-das-frutas. Embrapa Agroindústria Tropical, 29 p. (Circular Técnica 09).
- Thomas, D. B. Reproductive phenology of the Mexican fruit fly, *Anastrepha ludens* (Loew) (Diptera: Tephritidae) in the Sierra Madre Oriental, Northern Mexico. Neotropical Entomology 32, p.385-397.
- Weens Jr., H. V., Heppner, J. P., Steck, G. J., 2001. West Indian Fruit Fly, *Anastrepha obliqua* (Macquart). University of Florida, publication, n. 198, p. 8.
- Wigglesworth, V. B., 1972. The principles of insect physiology, 7 ed., Chapman and Hall, London.
- Zucchi, R. A., 1981. *Anastrepha Schiner*, 1868 (Diptera, Tephritidae): novas sinónimas. Revista Brasileira de Entomologia 25, p. 289-294.
- Zucchi, R. A., 2000a. Taxonomia, in: Malavasi, A.; Zucchi, R. A. (Ed.). Moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil: conhecimento básico e aplicado. Editora Holos, Ribeirão Preto, pp.13-24.
- Zucchi, R. A., 2001. Mosca-do-mediterrâneo, *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae), in: Vilela, E. F., Zucchi, R. A., CANTOR, F. (Ed.). Histórico impacto das pragas

introduzidas no Brasil. Editora Holos,
Ribeirão Preto, 173p.
Zucchi, R. A., 2008. Fruit flies in Brazil:
Anastrepha species their host plants and

parasitoids [online] Disponível em:
<www.lea.esalq.usp.br/anastrepha/>. Acesso
em: 08 maio 2016.